

Zeitraum	Wurmkur gegen	Wirkstoff
April/Mai	Rundwürmer (Kleine und Große Strongyloiden, Spulwürmer, Zwergfadenwürmer)	Ivermectin, Pyrantel
Juni/Juli/August	Rundwürmer	Ivermectin, Moxidectin, Pyrantel, Benzimidazol*
September/Oktober	Rund- und Bandwürmer	Ivermectin, Praziquantel
November	Rund- und Bandwürmer, Magendasseln	Ivermectin, Praziquantel, Moxidectin

Quelle: Reiterliche Vereinigung

Wurmbekämpfung bei Fohlen

Lebensalter	Parasiten	Wirkstoff	Bemerkung
4-6 Wo.	Zwergfadenwurm	BZ (Panacur) Ivermectin	Evtl. Monitoring
2-3 Mon.	Asc., kl. Palis.	BZ, Pyr., Ivermectin	Evtl. Monitoring
5 Mon.	Asc., kl. Palis., BW.	BZ, Pyr., ML, Evtl. PZQ	Evtl. Monitoring (BW., Asc.)
8 Mon.	Asc., Palis., BW, Dassell.	ML, evtl. PZQ	Evtl. Monitoring (BW)
1 Jahr	Asc., Palis.	BZ, Pyr., ML	

Quelle: modifiziert nach Samson-Himmelstjerna

Jährlinge und Jungpferde

Zeitpunkt	Parasiten	Wirkstoff	Bemerkung
1-2 Mon. nach Weideaustrieb (Juni/Juli)	Asc., Palis.	ML	Asc. nicht voll empfindlich
4-5 Mon. nach Weideaustrieb (Aug./Sept.)	Asc., Palis.	BZ, Pyr.	Palis. nicht voll empfindlich
Aufstallung (Nov., Dez)	Asc., kl. Palis., BW., Dassel	ML, evtl. PZQ	Evtl. Monitoring (BW., Asc.)
Febr./März	Asc., Palis.	BZ, Pyr.	Evtl. Monitoring (Asc., Palis.)

Quelle: modifiziert nach Samson-Himmelstjerna

Mindestens 5 Jährige mit Weidegang

Zeitpunkt	Parasiten	Wirkstoff	Bemerkung
1-2 Mon. nach Weideaustrieb (Juni/Juli)	Palis.	ML	
4-5 Mon. nach Weideaustrieb (Aug./Sept.)	Palis.	ML, BZ, Pyr.	Evtl. Monitoring
Aufstallung (Nov., Dez)	Palis., BW., Dassel	ML, evtl. PZQ	Evtl. Monitoring
Febr./März	Palis.	BZ, Pyr.	Evtl. Monitoring (Palis. nicht 100%)

Quelle: modifiziert nach Samson-Himmelstjerna